

Rat-Off Bloco

Grupo Químico: hidroxycoumarina

Ingrediente Ativo: Brodifacoum

Nome Químico: 3-(3-(4-bromo(1,1'-bifenil)-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenil)-4-hidroxi-2H-1-benzopirran-2-one

Fórmula Bruta: C H Br

Concentração: 0,005% (Brodifacoum)

Dados Toxicológicos:

DL oral aguda em ratos 0,22 - 0,27 mg i.a/kg ou 1,10 - 1,40 g (isca)/kg

DL oral aguda em camundongos: 0,40 mg.i.a/kg ou 0,20 g (isca)/kg

Formulação: Blocos parafinados

Registro ANVISA/MS N°3.1704.0024.001-0

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Raticidas eficazes a base de BROMADIOLONE ou BRODIFACOUM, de dose única, formulados em blocos parafinados resistentes a umidade, e iscas granuladas.

Altamente palatáveis e atrativas aos ratos e camundongos devido a fórmula com aromatizantes e essência preferidas dos roedores.

Produto pronto para uso e de segurança a animais domésticos e crianças devido ao BITREX (substância amarga) contida nas suas formulações.

INDICAÇÕES:

Usados para controle de roedores como: ratos de esgoto (*Rattus norvegicus*), ratos de telhado (*Rattus rattus*) e camundongos (*Mus musculus*), presentes em áreas públicas, armazéns, comércios, residências, escolas, hospitais, instalações rurais, etc.

MODO DE USAR:

Distribuir os sachês com iscas granuladas ou blocos parafinados em locais com infestações dos roedores, preferencialmente abrigando o raticida em caixas porta iscas, ou distribuindo o produto em locais onde os roedores transitam como: tocas, cantos, trilhas, bueros, etc. Esta operação deverá ser repetida de 7 a 10 dias após a primeira aplicação até que se perceba que não está mais havendo consumo dos raticidas pelos roedores.

O aparecimento de ratos mortos com 5 a 7 dias da aplicação, ou, o não consumo do produto após este período, é um indício de sucesso da eliminação dos ratos e camundongos.

Os blocos parafinados deverão ser usados preferencialmente em locais com umidade ou sujeitos a intempéries, enquanto que as iscas granuladas poderão ser usadas em locais internos.

APRESENTAÇÕES

Blocos Parafinados de 20g e 5g, e Iscas Granuladas (sachês) de 25g.

OBS: Usar luvas ao manusear o produto; Evite contato com a pele e olhos.

DOSE:

Colocar 1 a 2 sachês ou blocos de 20g para uma área equivalente a 10m² ou a cada 10 metros

MODO DE AÇÃO:

Anti-coagulante do sangue produzindo hemorragias internas até a morte dos roedores.

AÇÃO TÓXICA:

Anti-coagulante sanguíneo, fragilidade capilar e hemorragias.

ANTÍDOTO E TRATAMENTO:

Vitamina K1 e tratamento sintomático.