

Storm Bloco

STORM BLOCO é indicado para o controle de ratos, ratazanas camundongos. A morte do roedor ocorre alguns dias após a ingestão de uma única dose, devido a hemorragias internas generalizadas.

ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

CONTEÚDO: 500 g (25 x 20 g cada)

COMPOSIÇÃO:

Ingrediente ativo: Flocoumafen

Formulação: Iscas granuladas

Concentração: 0,005%

Nome químico: 4-hydroxy - 3-{1,2,3,4-tetrahydro-3- [4-(4-trifluorimethylbenzyl=oxy)phenyl]-1-naphthyl} coumarin

Toxicologia:

DL50 oral/ratos albinos (machos e fêmeas).....2000 mg/kg

DL50 dermal/ratos albinos (machos e fêmeas)...4000 mg/kg

CL50 inalatória: não aplicável, por ser produto da área de saneantes.

Irritabilidade dérmica: Os animais apresentam eridema fraco e edema muito fraco - Irritabilidade ocular: não irritante.

Fórmula empírica: C33H25F3O4

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo químico: Derivado de cumarina

Nome comum: Flocoumafen

Ação tóxica: Anticoagulante, provoca fragilidade capilar e hemorragias.

Antídoto/Tratamento: vitamina K1 injetável.

Telefone de Emergência:

0800-11-2273

MODO DE APLICAÇÃO OU USO:

A- PREPARO DO LOCAL PARA ISCAGEM:

Inspeccionar cuidadosamente a área infestada, para localizar todas as entradas, carreiras, tocas, ninhos e fontes de alimento dos ratos, de forma a determinar os melhores "pontos de iscagem", cuidando para que sejam inacessíveis para crianças e animais domésticos.

Cobrir ainda os "pontos de iscagem" com manilhas, tijolos, telhas, tábuas ou outros materiais de forma a protegê-los da chuva e evitar o acesso de outros animais.

B- ISCAGEM

- Ratos e Ratazanas:

Selecionar pontos de iscagem adequados, tais como tocas de ratos, ativos, ao longo de carreiras de ratos e embaixo de lixo amontoado. Colocar os blocos de 2 a 5 metros de distância um do outro, conforme o nível de infestação. Distribuir 10 blocos de 3,6 g ou 2 a 3 blocos de 20g em cada ponto de iscagem e 5 blocos de 3,6 g ou 1 bloco de 20g em cada toca de rato, ratazana ou camundongo. Os "pontos de iscagem" deverão ser inspecionados após 3 dias da colocação dos blocos e, qualquer bloco que tenha sido consumido, deverá ser reabastecido. Inspeccionar todos os pontos de iscagem e tocas de ratos em intervalos de 7 dias, reabastecendo os pontos e tocas, caso os blocos tenham sido consumidos.

- Camundongos:

Os camundongos geralmente percorrem pequenas distâncias dentro da área em que vivem e são mais difíceis de combater que ratos e ratazanas devido aos seus hábitos imprevisíveis. Por isso, a prévia exploração do local a tratar é muito importante. Distribuir 1 bloco de 20 g ou 5 de 3,6 g até 2 metros de distância entre iscas nas áreas onde a presença de camundongos é mais frequente. Dentro de casas habitadas, depósitos, etc, colocar 1 bloco de 20 g ou 5 de 3,6 g em locais abrigados, inacessíveis para crianças, cães e gatos e onde os camundongos estão mais ativos, como sob o assoalho, cavidades no teto, ao longo de tubulações e conduites e atrás de revestimentos de madeira, móveis e utensílios domésticos. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados e reabastecidos com iscas a cada 7 dias.

INSTRUÇÕES GERAIS: (de acordo com portaria 321)

- Antes de usar leia com atenção as instruções do rótulo.
- Não aplicar o produto sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Tóxico para peixes.
- Não fumar durante a aplicação.
- Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Não colocar as "iscas" em pratos, pires ou qualquer outro utensílio doméstico.
- Manter o produto na embalagem original.

- Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais.

PRIMEIROS SOCORROS

- Em caso de ingestão acidental, provocar o vômito e procurar imediatamente o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Evitar a inalação, aspiração e o contato com os olhos. Em caso de contato com a pele, lavar as partes atingidas com água e sabão em abundância.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.
- Em caso de sobra de produto, o mesmo deverá ser recolhido e enterrado.

Responsável Técnico: José Roberto Teixeira Marques, CRQ 03311088 - 3ª Região.

Registrado no Ministério da Saúde sob nº: 3.0052.0048.001-1

FLOCOUMAFEN FABRICADO POR:

Sorex Limited - St. Michael's INT. State - Cheshire - WA8-8TJ - Widnes - Inglaterra

Fabricante:

BASF S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 – 8º andar

Edifício Faria Lima Square - Itaim Bibi

04538-132 – São Paulo - SP - CNPJ: 48.539.407/0001-18